

|                   |                          |           |
|-------------------|--------------------------|-----------|
| レジメンコード           |                          |           |
| 140307            |                          |           |
| レジメン名             | 癌腫                       | 総コース数     |
| ペムブロリズマブ+TC+BEV療法 | 化学療法歴のない<br>進行または再発子宮頸がん | 増悪が見られるまで |

| 番号 | 薬品名                                       | 投与量                               | 投与方法 | Day1            | Day2     | Day3 | Day4 | ... | Day21 | 備考          |
|----|---|-----------------------------------|------|-----------------|----------|------|------|-----|-------|-------------|
| 1  | 生食注                                       | 50mL                              | 点滴静注 |                 |          |      |      |     |       |             |
| 2  | 生食注<br>キイトルーダ                             | 100mL<br>200mg/Body               | 点滴静注 |                 |          |      |      |     |       | 抗がん剤        |
| 3  | パロノセトロン静注<br>デキサート注射液<br>ファモチジン注射用<br>生食注 | 0.75mg<br>19.8mg<br>20mg<br>100mL | 点滴静注 |                 |          |      |      |     |       | 制吐剤+アレルギー予防 |
| 4  | 生食注<br>パクリタキセル注                           | 500mL<br>175mg/m <sup>2</sup>     | 点滴静注 |                 |          |      |      |     |       | 抗がん剤        |
| 5  | 生食注<br>カルボプラチン注                           | 250mL<br>AUC=5                    | 点滴静注 |                 |          |      |      |     |       | 抗がん剤        |
| 6  | 生食注<br>アバステチン注                            | 100mL<br>15mg/kg                  | 点滴静注 |                 |          |      |      |     |       | 抗がん剤        |
| 7  | 生食注                                       | 50mL                              | 点滴静注 |                 |          |      |      |     |       |             |
| 8  | ペミロラストK錠<br>レスタミンコーワ錠                     | 10mg/回<br>50mg/回                  | 経口   |                 |          |      |      |     |       | アレルギー予防     |
| 9  | アプレピタントカプセル                               | 125mg/回                           | 経口   | 制吐剤点滴<br>開始時に内服 |          |      |      |     |       | 制吐剤         |
| 10 | アプレピタントカプセル                               | 80mg/回                            | 経口   |                 | 1日1回 朝食後 |      |      |     |       | 制吐剤         |
| 11 | デカドロン錠                                    | 8mg/回                             | 経口   |                 | 1日1回 朝食後 |      |      |     |       | 制吐剤         |